Modo de empleo

PrMOUNJARO®

tirzépatide

Inyectable – frasco de dosis única para

administración subcutánea

Frasco de dosis única de 5 mg/0,5 mL

Frasco de dosis única de 7,5 mg/0,5 mL

Frasco de dosis única de 10 mg/0,5 mL

Frasco de dosis única de 12,5 mg/0,5 mL

Frasco de dosis única de15 mg/0,5 mL

Lea esto antes de usar MOUNJARO:
Lea cuidadosamente esta guía de uso y la información para el paciente antes de utilizar MOUNJARO por primera vez y cada vez que adquiera un nuevo frasco.

No sustituye las indicaciones de su profesional de la salud.

Pida a su médico o farmacéutico que le enseñe cómo inyectar correctamente el medicamento.

- MOUNJARO se presenta en un frasco de dosis única..
- Se usa una vez por semana mediante inyección subcutánea (debajo de la piel).
- No reutilice las jeringas ni las agujas.
- No comparta jeringas o agujas para evitar infecciones graves.

Antes de inyectarse: Reúna los materiales necesarios para la inyección.

- 1 frasco de MOUNJARO de dosis única.
- 1 jeringa y 1 aguja (según recomendación médica).
- Toallitas con alcohol.
- Gasa estéril.
- Contenedor para objetos punzocortantes.

Sección Eliminación de agujas y jeringas usadas al final de este manual de instrucciones



La aguja y la jeringa se muestran sólo con fines ilustrativos. La apariencia de la aguja o jeringa recomendada por su profesional de la salud puede ser diferente a las que se muestran en este MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Préparation de l'injection de MOUNJARO

- **Saque el frasco** del refrigerador.
- Lávese las manos.
- **Verifique** que el medicamento sea el correcto y que no esté vencido.

- El líquido debe ser incoloro o ligeramente amarillo.
- **No utilice** el medicamento si está congelado, turbio o contiene partículas.

Paso 1: Retire el protector plástico del frasco (no retire el tapón de goma).	
Paso 2 : Limpie el tapón de goma con una toallita con alcohol.	
Paso 3 : Retirar del embalaje de la jeringa	

Paso 4 : Retire el embalaje de la aguja. Es posible que la aguja que le haya recomendado su profesional de la salud tenga una aguja preinstalada. Si es así, proceda al paso 6.	
Paso 5 : Alinee la aguja y manténgala recta mientras la conecta a la jeringa. Coloque la aguja en el extremo de la jeringa y enrosquela hasta que quede segura, según las instrucciones de su profesional de la salud.	
Paso 6 : Retire el protector de la aguja tirando de él hacia afuera. Tenga cuidado de que la aguja no entre en contacto con ninguna otra superficie.	
Paso 7 : A. Apunte la aguja de la jeringa hacia arriba B. Presione el émbolo hasta que la punta alcance la marca que indica que se han aspirado al menos 0,5 ml de aire en la jeringa.	
Paso 8 : Inserte la aguja en el frasco a través del tapón.	
Paso 9 : Empuje el pistón hasta el fondo. Esto fuerza la entrada de aire en el vial, lo que facilita la extracción de la solución**.**	

Paso 10 : A. Invierta el frasco y la jeringa, y extraiga lentamente 0.5 mL de solución. B. Verifique que no haya burbujas de aire. C. Si hay burbujas de aire, golpee la jeringa hasta que las burbujas suban.	 
Paso 11 : Empuje lentamente el émbolo hasta que la punta alcance la línea que indica 0,5 ml. En este punto, ya no debería haber aire en la jeringa.	
Paso 12 : Retire la jeringa del tapón de goma del vial. Asegúrese de retirar la jeringa sosteniéndola recta para evitar doblar la aguja. Retire la jeringa en línea recta sin tocar superficies externas.	

Inyección de Mounjaro

- Inyecte exactamente como le haya indicado su profesional de la salud.
- Se debe tener cuidado de alternar los puntos de inyección de un momento a otro. Puede utilizar la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de elegir un sitio de inyección diferente. Cambiar el lugar de la inyección reduce el riesgo de desarrollar cualquiera de las siguientes afecciones en el lugar de la inyección:

Lipodistrofia (piel engrosada o hundida)

Amiloidosis cutánea localizada (bulto en la piel)

- **No inyecte** el medicamento en áreas donde la piel esté hueca, gruesa o presente protuberancias..
- **No debe inyectar** el medicamento en áreas donde la piel esté sensible, amoratada, seca o endurecida, ni en cicatrices o lesiones cutáneas.
- **No mezcle** Mounjaro con ningún otro medicamento.
- **No inyecte** Mounjaro en el mismo lugar de inyección que otros medicamentos.

Paso 13 : Seleccione el punto de inyección. Prepare el lugar de la inyección según las instrucciones de su profesional de la salud. Mounjaro se inyecta debajo de la piel (inyección subcutánea) • Usted u otra persona puede inyectar el medicamento en su estómago (abdomen) o muslo. O • Otra persona puede inyectarlo en la parte superior de la espalda del brazo.	 O
Paso 14 : Inserte la aguja en su piel.	
Paso 15 : • Presione el émbolo para inyectar la dosis completa. El extremo del émbolo debe estar en la parte inferior de la jeringa. • La aguja debe permanecer en la piel durante al menos 5 segundos para garantizar que haya inyectado todo el medicamento.	
Paso 16 : Retire la aguja de su piel • Si ve sangre después de retirar la aguja de la piel, aplique presión en el lugar de la inyección con una gasa o un hisopo con alcohol. No frote el lugar de la inyección.